

# Avmaskningsrekommendationer för hund

## Spolmask

### Valpar

Valpar i kennelmiljö avmaskas med en kur vid 14-20 dagars ålder och därefter varannan (pyrantel) till var fjärde.

(fenbendazol) vecka upp till 3 månaders ålder. Valpar till sällskapshundar kan undersökas på förekomst av maskäg

vid 4 veckors ålder för att fastställa om avmaskningsbehov föreligger.



### Tikar för avel

De undersöks på förekomst av maskäg i träckprov eller avmaskas samtidigt som valparna avmaskas första gången. Tikar i kennlar med dokumenterat svåra spolmaskproblem kan eventuellt avmaskas med fenbendazol dagligen från dag 40 under dräktigheten till och med 14 d efter valpningen.

### Vuxna hundar

Undersöks på förekomst av maskäg i träckprov eller vid högt smittryck avmaskas årligen. Vissa individer får återkommande spolmaskinfektioner trots regelbunden avmaskning. Om möjligt bör man ta reda på smittkällan. Ofta behöver dessa hundar avmaskas 1 gång per månad med fenbendazol under det första halvåret.

Foto Bengt Ekberg

## Hakmask, piskmask, bandmask, Toxascaris

Avmaskning vid konstaterad förekomst. Hakmaskinfektion kan vara svårbehandlad. Vid konstaterad infektion rekommenderas tre kurer med 2 veckors mellanrum. Till exempel Axilur kan användas. Behandlingen följs upp med träckprovsundersökning 4 veckor efter avslutad behandling. Hundar som pendlar till Danmark: prazikvantel var 26:e dag.

[Senast uppdaterad 2008-12-08]